

БОТАНІКА

УДК 581.526.324: 581.9

Л. М. Гомля, Д. А. Давидов

Полтавський державний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка

ДОПОВНЕННЯ ДО "КОНСПЕКТУ ФЛОРИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНІПРОВ'Я" ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Флора, рід, родина, порядок, клас, відділ, Полтавщина

Одним з найновіших і найповніших зведень щодо флори Полтавської області є "Конспект флори Лівобережного Придніпров'я" О.М.Байрак [1] (далі – "Конспект..."). Але вважати цю працю опорною для проведення флористичних досліджень не варто, оскільки в ній допущено чимало дрібних, але суттєвих помилок. Ряд деяких типових для Лівобережного Лісостепу видів (*Spiraea crenata*, *Otites densiflora* тощо) в цій роботі не наводиться взагалі, екотопи зростання видів наведено спрощено, а частота поширення деяких видів – взагалі неправильно. Це, мабуть, є наслідком індуктивного підходу до вивчення біорізноманіття. Також не повністю проведений аналіз літературних джерел. Так, більшість наведених нижче видів вказані С.О.Іллічевським [4] для околиць м. Полтави. Види, які не згадані ні в праці С.О.Іллічевського, ні у жодній з сучасних ботанічних праць, вказані як нові види для флори Полтавської області.

Отже, у Полтавському районі, на території якого ми проводили флористичні дослідження протягом 2003-2006 рр., виявлено 31 вид, який не наведений у "Конспекті..." для Полтавської області взагалі (серед них 18 видів нових для Полтавщини), 15 видів, що наведено для Полтавської області тільки за літературними джерелами, і 44 види, які не згадано в "Конспекті..." для Дикансько-Котелевського геоботанічного району (РПО:10) (рис. 1), в межах якого і розташовані адміністративні межі Полтавського району. Нижче наводимо перелік згаданих видів за схемою, запропонованою у "Конспекті..." з вказівками їх місцевонаходжень.

ВІДДІЛ MAGNOLIOPHYTA – ПОКРИТОНАСІННІ

КЛАС MAGNOLIOPSIDA – ДВОДОЛЬНІ

ПОРЯДОК PAPAVERALES – МАКОЦВІТІ

РОДИНА FUMARIACEAE – РУТКОВІ

Pið Corydalis Vent. – ряст

C. intermedia (L.) Merat – *p. проміжний*. У широколистяних лісах. Зрідка. Вірогідно, єдина популяція цього виду на території Полтавської області, виявлена в Пушкарівському лісі м. Полтави, у складі декількох невеликих угруповань, які потребують охорони. Для флори Полтавщини наводиться вперше.

РОДИНА PAPAVERACEAE - МАКОВІ

Pið Papaver L. – мак

P. dubium L. – *m. сумнівний*. Поблизу доріг та на полях як бур'ян. РПО:9. ПДО:4. Зрідка. В 2003-2004 рр. цей вид виявлено на трав'янистих схилах вздовж шосе „Київ-Харків” навпроти с. Горбанівки, хоча згодом його не знаходили.

ПОРЯДОК CARYOPHYLLALES – ГВОЗДИКОЦВІТІ

РОДИНА NYCTAGINACEAE – НІКТАГІНОВІ

Pið Oxybaphus L.'Her. – оксибафус

O. pustagineus (Michx.) Sweet – *o. нічноцвітний*. Вздовж залізниць як бур'ян. Лише в околицях м. Полтави (Локомотивне депо, станції Крутій Берег, Вакуленці, Кривохатки, Пост-Ворскла). Рослина заносна. Новий вид для флори Полтавщини.

БОТАНІКА

РОДИНА CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИЧНІ

Piò Eremogone Fenzl. – еремогоне

E. biebersteinii (Schlecht.) Holub – *e. Біберштейна*. На степових схилах. Наводиться у літературі як надто рідкісний вид на північній межі ареалу в околицях м. Полтави. Нами вид виявлений у 2006 р. на застепнених узліссях в Чалівському лісництві поблизу залізниці (на прогоні „Копили-Микільське”). Виявлений локус потребує охорони.

Piò Gypsophila L. – леция

G. perfoliata L. – *л. пронизанолиста*. На солонцевих луках. Зрідка. Наводиться лише у літературі (РПО:10,11). Нам вдалося виявити невелику зарість цього виду на вологій піщаній ділянці поблизу дороги „Полтава-Котельва” за с. Вакуленці. Зрідка.




Рис. 1. Геоботанічне районування Лівобережного Придніпров'я
Геоботанічні райони:

I – Придніпровський округ (ПДО):

1 - Середнібодніпровський

2 - Баришівсько-Бориспільський

3 - Яготинсько-Оржицький

4 - Оболонсько-Кобеляцький

II – Бахма茨kий округ (БО):

5 – Бобровицько-Бахма茨kий

6 – Конотопський

III – Роменсько-Полтавський округ (РПО):

7 – Прилуцько-Лохвицький

8 – Гадяцько-Миргородський

9 – Зіньківсько-Решетилівський

10 – Дикансько-Котелевський (Ворсклянський)

Piò Otites Adans. – ушанка

O. densiflora (D'Urv.) Grossh. – *у. густоцвіта*. На борових пісках, узліссях соснових лісів. В Полтавському районі трапляється спорадично на боровій терасі р. Ворскла в Руднянському (села Вакуленці, Кованьківка, Макухівка, Рудне) і Чалівському (села Терешки, Триби, Микільське) лісництвах.

Piò Psamophiliella ikonn. – *псамофілієлла*

БОТАНІКА

P. stepposa (klok.) Ikonn. – *n. степова*. На степових і крутых річкових схилах. Зрідка. Виявлена по берегах річок Вільшани (села Верхні Вільшани, Судіївка) та Ворскли (за с. Нижні Млини). Новий вид для флори Полтавщини.

Pið *Stellaria* L. – *зірочник*

S. fragilis Klok. – *з. ламкий*. На заплавних луках. РПО:7. Зрідка. Виявлений на вологих пісках у с. Вакуленці та в урочищі поблизу с. Триби. Трапляється зрідка.

РОДИНА CHENOPodiACEAE – ЛОБОДОВІ

Pið *Atriplex* L. – *лутига*

A. nitens Schkuhr. – *л. близкучка*. На солонцоватих луках. ПДО:3,4.

Спорадично. Зростає і на забур'янених місцях в м. Полтава та у багатьох селах, а також на крутых берегах р. Ворскла (с. Нижні Млини).

A. oblongifolia Waldst. et Kit. – *л. видовженолистиста*. На солонцоватих пісках. Наводиться у літературі. ПДО:3,4. Зрідка. Виявлена на забур'яненій лучній ділянці в Пушкарівській балці м. Полтави (невелика група).

A. prostrata Boucher – *л. лежача*. На солончакових луках. РПО:9. ПДО:3,4. Також зростає на забур'янених місцях, прирічкових пісках та у заплавних лісах. Виявлена у м. Полтава (райони міста Левада і Климівка), неподалік дамби в с. Нижні Млини, поблизу сел Безручки та Буланове. Трапляється невеликими групами.

Pið *Corispermum* L. – *верблюдка*

C. marschallii Stev. – *в. Маршаллова*. На прирічкових пісках. Наводиться у літературі. РПО:10. ПДО:1. Зрідка (по берегах річок Дніпра і Ворскли). Нами виявлені місцезростання цього виду на правому березі р. Ворскла за селами Нижні Млини та Буланове.

ПОРЯДОК POLYGONALES – ГРЕЧКОЦВІТІ

РОДИНА POLYGONACEAE – ГРЕЧКОВІ

Pið *Polygonum* L. – *гірчак, спориши*

P. arenarium Waldst. et Kit. – *с. пісковий*. На пісках. По боровій терасі р. Дніпра. Часто в ПДО. Також зростає по боровій терасі р. Ворскли (с. Копили – дуже рідко; села Триби, Терешки, Вовківка, Тернівщина, ліс поблизу с. Рудне).

P. minus Huds. – *г. малий*. На вогких луках. Вказується як літературний для Сумської області (заповідник Михайлівська цілина, РПО:8). Виявлений на вологих пісках в урочищі поблизу с. Триби.

Pið *Rumex* L. – *щавель*

R. maritimus L. – *щ. морський*. На засолених луках. ПДО:4. Спорадично. Виявлений на лівому березі р. Коломак (район міста Полтави Лісок). Також зростає на вологих пісках по берегах р. Ворскли (поблизу с. Кротенки), р. Коломаку (с. Макухівка) та у лісі поблизу с. Рудне.

ПОРЯДОК VIOLALES – ФІАЛКОЦВІТІ

РОДИНА VIOLACEAE – ФІАЛКОВІ

Pið *Viola* L. – *фіалка*

V. montana L. – *ф. гірська*. В лісах, на узліссях. РПО:8,9. ЕО:5. Спорадично. Невелика зарість цього виду виявлена в урочищі поблизу с. Триби.

ПОРЯДОК CAPPARALES – КАПЕРЦЕВОЦВІТІ

РОДИНА BRASSICACEAE – КАПУСТЯНІ

Pið *Alyssum* L. – *бурачок*

A. hirsutum Bieb. et Grande – *б. шершавий*. На степових схилах. РПО:8,9,11. ПДО:1,3,4. Спорадично. Виявлений як бур'ян вздовж залізниці на прогоні „Копили-Микільське”.

Pið *Diplotaxis* DC. – *дворядник*

D. muralis (L.) DC. – *д. муровий*. Поблизу доріг та жител. Наводиться у літературі для Полтави. Нами виявлений неподалік залізничної ст. Пост-Ворскла та поблизу нового корпусу ПДПУ імені В.Г. Короленка.

Pið *Euclidium* R. Br. – *евклідій*

E. syriacum (L.) R. Br. – *e. сирійський*. Поблизу дороги, на полях. ПДО:2,4. Спорадично. Виявлений неподалік с. Кротенки на глинистій забур'яненій ділянці.

Pið *Lepidium* L. – *хрінниця*

L. perfoliatum L. – *х. пронизанолистиста*. На сухих схилах, поблизу доріг.

Часто в ПДО. Знайдена вздовж залізниці на пагорбі за с. Копили і біля станції „8 км”.
Заносний бур'ян.

Pið *Rapistrum* Crantz – *pinicja* R. rugosum (L.) All. – *r. зморишкувата*. Як

БОТАНІКА

бур'ян на полях. РПО:8. Зрідка. Виявлений поблизу садів у с. Щербані.

Pið Sisymbrium L. – сухоребрик

S. polymorphum (Murr.) Roth – *с. мінливий*. На степових ділянках. РПО:8 (Сумська обл.). ПДО:4. Зрідка. Знайдений на степових схилах за селами Вороніно і Абазівка та у Рожаївському ботанічному заказнику.

S. wolgense Bieb. ex Fourn. – *с. волзький*. На полях, біля доріг. РПО:10. ПДО:4. Зрідка. Наводиться у літературі. Досить поширеній вздовж залізниць (ст. Пост-Ворскла, Герівка, Лісок, Крутій берег та за Микільським переїздом).

ПОРЯДОК SALICALES – ВЕРБОЦВІТИ

РОДИНА SALICACEAE – ВЕРБОВІ

Pið Salix L. – верба

S. viminalis L. – *в. прутовидна*. На вологих місцях, по берегах водойм. РПО:7. БО:5. ПДО:3. Спорадично. Зростає на заболоченому узлісся листяного лісу за с. Розсошенці.

ПОРЯДОК SAXIFRAGALES – ЛОМИКАМЕНЕВОЦВІТИ

РОДИНА SAXIFRAGACEAE – ЛОМИКАМЕНЕВІ

Pið Chrysosplenium L. – жовтяниця

**C. alternifolium* L. – *ж. черговолиста*. У вологих лісах, біля джерела. РПО:7,8. БО:5. Зрідка. Зростає там, де і попередній вид, поблизу струмка.

ПОРЯДОК ROSALES – РОЗОЦВІТИ

РОДИНА ROSACEAE – РОЗОВІ

Pið Potentilla – перстач

P. heptaphylla L. – *п. семилисточковий*. На піщаних пагорбах, схилах. РПО:7,11. Зрідка. Наводиться в літературі. Виявлений в урочищі поблизу с. Триби.

P. thyrsiflora Huels. ex Zimm. – *п. пірамідоквітковий*. На узліссях соснових лісів. РПО:7 та БО:5 (Чернігівська обл.). Зростає на забур'янених пісках вздовж залізниць (Локомотивне депо, ст. Пост-Ворскла, Копили).

Pið Spiraea L. – таволга, спірея

S. crenata L. – *т. зарубчаста*. На піщаних узліссях. Знайдений по краях урочища поблизу с. Триби (46 кв. Чалівського лісництва). Зрідка.

ПОРЯДОК FABALES – БОБОВОЦВІТИ

РОДИНА FABACEAE – БОБОВІ

Pið Anthyllis L. – заяча конюшина

A. macrocephala Wend. – *з. к. багатолиста*. На лучних степах. РПО:7,8,9,11. ПДО:4. Спорадично. Виявлена на піщаних луках за с. Вакуленці (неподалік бази ФК «Ворскла»).

Pið Lathyrus L. – чина

***L. venetus* (Mill.) Wohlf – *ч. ряба*. У широколистяних лісах. Зрідка (Розсошенське лісництво, за с. Тютюнники). Новий вид для флори Полтавщини. Рослина потребує охорони.

Pið Melilotus Mill. – буркун

M. wolgicus Poir. – *б. волзький*. На пісках вздовж залізниць. Зрідка, поблизу м. Полтави (с. Герівка, біля дороги „Климівка-Лісок”). Рослина заносна. Новий вид для флори Полтавщини.

Pið Trifolium L. – конюшина

T. aureum Poll. – *к. золотиста*. На галевинах, узліссях, луках. РПО:9 (Сумська обл., заповідник Михайлівська цілина). Зрідка. Поодинокі особини знайдені по краях урочища Триби.

T. dubium Sibth. – *к. сумнівна*. На луках. РПО:11. ПДО:2. Зрідка. Наводиться у літературі. Невеликі групи цього виду зростають на вологих вирубках в Чалівському лісництві (села Вовківка, Триби).

Pið Vicia L. – горошок

V. angustifolia Reichard – *г. вузьколистий*. На луках, полях. РПО:7,8.

ПДО:2. Спорадично. Виявлено декілька чисельних локусів (райони міста Полтави: Левада, Тютюнники, Гора, Поле Полтавської битви).

V. grandiflora Scop. – *г. великоцвітковий*. На лісових галевинах і луках. ПДО:3,4. Спорадично. Часто зростає разом з попереднім (райони міста Полтава: Левада, Тютюнники, Гора).

ПОРЯДОК MYRTALES – МИРТОЦВІТИ

РОДИНА ONAGRACEAE – ОНАГРОВІ

БОТАНІКА

Pið Circaeа L. – цирцея

С. lutetiana L. – ц. звичайна. У листяних лісах. ПДО:3. РПО:8 (Сумська обл.). Зрідка. Виявлена у вільшняку поблизу с. Зінці.

ПОРЯДОК GERANIALES – ГЕРАНІЄЦВІТІ

РОДИНА ZYGOPHYLLACEAE – ПАРОЛИСТОВІ

Pið Tribulus L. - якірці

Т. terrestris L. – я. сланки. На пісках. Часто в ПДО. Виявлений вздовж залізниць (ст. Копили, Зінці, Клюшники). Рослина заносна.

РОДИНА GERANIACEAE – ГЕРАНІЄВІ

Pið Geranium L. – герань

G. molle L. – г. м'яка. Поблизу доріг. Наводиться у літературі для околиць Полтави. Виявлена у місті по вул. Яківчанській.

РОДИНА BALSAMINACEAE – БАЛЬЗАМИНОВІ

Pið Impatiens L. – розрив-трава

I. glandulifera Royle – р.-т. залозиста. По берегах струмків і джерел, у вільшняках і на болотах. Як здичавіле. В околицях м. Полтави досить часто по берегах малих річиків міста (Тарапунька, Рогізна, Вільшана) та в Пушкарівському балці.

ПОРЯДОК ARALIALES – АРАЛІЄЦВІТІ

РОДИНА APIACEAE – ЗОНТИЧНІ

Pið Astrodaucus Drude – морківниця

A. orientalis (L.) Drude – м. східна. На піскувато-кам'янистих ділянках вздовж залізниць. Зрідка. Виявлена на прогоні „Копили-Микільське”. Рослина занесена з Криму. Для флори Полтавщини наводиться вперше.

ПОРЯДОК RHAMNALES – ЖОСТЕРОЦВІТІ

РОДИНА VITACEAE – ВИНОГРАДОВІ

Pið Parthenocissus Planch – дикий виноград

P. quinquefolia (L.)

Planch – д. в. п'ятилисточковий. У заплавних лісах.

Як здичавіле. ПДО:4. Спорадично. Часто дичавіє і в Полтавському районі, трапляючись у лісах Розсошенського і Чалівського лісництв.

ПОРЯДОК GENTIANALES – ТИРЛИЧЕЦВІТІ

РОДИНА GENTIANACEAE – ТИРЛИЧЕВІ

Pið Gentiana L. – тирлич

*G. pneumonanthe L. – т. звичайний. На вологих луках. РПО:8 (Сумська обл.). ПДО:3. Зрідка. Невеликі групи цієї рослини зростають на заболочених вирубках лісів Чалівського лісництва в с. Триби та за с. Вовківка.

РОДИНА RUBIACEAE – МАРЕНОВІ

Pið Galium L. – підмаренник

G. boreale L. – п. північний. На лісових галявинах. ПДО:3,4. Зрідка. Виявлений в лісах Чалівського лісництва (села Копили, Триби, Вовківка).

G. humifusum Bieb. – п. сланкий. На схилах вздовж залізниць. Як заносна рослина . Виявлений на прогоні „Копили-Микільське” та „Крутій Берег-Кривохатки”. Трапляються чисельними групами.

G. octonarium (Klok.) Soo – п. восьмилистковий. На степових схилах. Спорадично в ПДО. Наводиться в літературі. Виявлений за селами Абазівка, Мачухи та Гора (невеликі групи).

ПОРЯДОК POLEMONALES – СИНОХОЦВІТІ

РОДИНА BORAGINACEAE – ШОРСТКОЛИСТІ

Pið Anchusa L. – воловик

*A. gmelinii Ledeb. – в. Гмеліна. На піщаних кучугурах. ПДО:1,3,4.

Спорадично. Встановлено, що цей вид зростає на пісках борових терас р. Ворскли (с. Терешки, за с. Вакуленці, поблизу дороги на с. Котельву) та Коломаку (села Затурине, Андрушки, Куликове).

Pið Lycopsis L. – крикоцвіт

L. arvensis L. – к. польовий. Як бур'ян на полях. Виявлений за с. Щербані, де зростає іноді разом з Rapistrum rugosum.

Pið Symphytum L. – живокіст

БОТАНІКА

S. tauricum Willd. – *ж. кримський*. У широколистяних лісах. Зрідка у лісах Розсошенського лісництва (с. Тютюнники, між селами Буланове та Сапожино). Потребує охорони на регіональному рівні.

ПОРЯДОК SCROPHULARIALES – РАННИКОЦВІТІ

РОДИНА SCROPHULARIACEAE – РАННИКОВІ

Pið Melampyrum L. – *перестріч*

M. vulgatum Pers. (*M. pratense* L. p. p.) – *п. звичайний*. На узліссях соснових лісів. Зрідка в Чалівському лісництві (села Триби, Вовківка), здебільшого нечисленними групами.

Pið Veronica L. – *вероніка*

V. paczoskiana Klok. – *в. Пачоського*. На борових пісках, узліссях соснових лісів. Зрідка (села Вакуленці, Триби, Вовківка, Микільське).

V. prostrata L. – *в. лежача*. На луках, узліссях. РПО:7,9. Спорадично. Досить чисельні локалітети виявлені в Пушкарівській балці, за селами Кротенки, Мачухи, Абазівка, Горбанівка.

РОДИНА PLANTAGINACEAE – ПОДОРОЖНИКОВІ

Pið Plantago L. – *подорожник*

P. cornutii Gouan. – *п. Корнута*. На солончакових луках. ПДО:2,3,4. Спорадично. В околицях Полтави поодиноко зростає на вологих піщаних місцях з незначним засоленням на лівому березі р. Коломак між районами міста Полтави Ліском і Герівкою.

P. dubia L. – *п. сумнівний*. На піщаних ділянках. Невелика група особин виявлена вздовж залізниці на прогоні „Копили-Микільське”. Зрідка. Для флори Полтавщини вказується вперше.

ПОРЯДОК LAMIALES – ГУБОЦВІТІ

РОДИНА LAMIACEAE – ГУБОЦВІТІ

Pið Mentha L. – *м'ята*

M. gentilis L. – *м. споріднена*. На сухих забур'янених ділянках. Невелика група особин знайдена поблизу городів за с. Розсошенці. Зрідка. Новий вид для флори Полтавщини.

ПОРЯДОК ASTERALES – АЙСТРОЦВІТІ

РОДИНА ASTERACEAE – АЙСТРОВІ

Pið Artemisia L. – *полин*

A. santonica L. – *п. сантонінський*. На засолених луках. РПО:11. ПДО:4. Спорадично. Виявлений в заплаві р. Полузір'я за с. Абазівка.

Pið Aster L. – *айстра*

**A. amelloides* Bess. – *а. заміцуюча*. На степових схилах. РПО:8 (Сумська обл.). ПДО:2,4. Зрідка. Нечисельна група особин знайдена на степових ділянках за с. Абазівка.

Pið Barkhausia Moench – *баркгаузія*

B. rhoeadifolia Bieb. – *б. маколиста*. Як бур'ян на сухих луках, схилах, узліссях. Зрідка (села Розсошенці, Пожежна Балка). Всюди дуже нечисленно. Новина для Полтавщини.

Pið Carduus L. – *будяк*

C. thoermerii Weim. – *б. Термера*. На пустирях. РПО:10. Дуже рідко. Наводиться у літературі. Нами встановлено, що кілька особин цього виду зростає на степових ділянках за с. Мачухи (поблизу дороги на с. Калашники).

Pið Centaurea L. – *волошка*

**C. orientalis* L. – *в. східна*. На степових схилах. РПО:9,11. ПДО:4. Зрідка. Невеликий за чисельністю локус знайдений на узліссях соснових насаджень між с. Абазівка та Рожаївка.

**C. sumensis* Kalen. – *в. сумська*. На степових схилах, по борових пісках. РПО:9,11. ПДО:1 (Київська обл.). Зрідка. Доволі часто трапляється у лісах Чалівського лісництва (села Копили, Терешки, Вовківка, Триби).

C. substituta Czern. – *в. заміцуюча*. На лісових галявинах та узліссях. ПДО:3,4. Зрідка. В околицях Полтави трапляється в значній кількості. Виявлені знахідки в районах міста: Вороніно, Тютюнники, Гора, Триби, Мачухи, села Рудне, Терешки, Буланове. Майже скрізь, але поодиноко, або дуже нечисленними групами.

Pið Cirsium Mill. – *осот*

**C. esculentum* C. A. Mey – *о. їстівний*. На солончакових луках. РПО:8,11. ПДО:4. Зрідка. Виявлені знахідки в долинах р. Ворскли (села Левада, Буланове, Патлаївка), р. Коломак (район міста Полтави Лісок), р. Полузір'я (с. Абазівка).

БОТАНІКА

C. incanum (S. G. Gmel.) Fisch. – *о. сивий*. На затінених вологих, іноді забур'янених місцях. Зрідка в м. Полтава (район міста Огнівка, вул. Монастирська), а також за с. Розсошенці та Нижні Млини.

Pið Gnaphalium L. – сухоцвіт

G. luteo-album L. – *с. жовтувато-білий*. По берегам річок, на пісках. ПДО:1,4. Зрідка. Знайдена по берегах р. Ворскли поблизу с. Кротенки.

Pið Grindelia Willd. – гринделія

G. squarrosa (Pursh.) Dun. – *г. розчепіrena*. На забур'янених місцях. Наводиться лише одне місце знаходження – поблизу залізничного вокзалу м. Полтави. Але, крім цього, вдалося виявити ще 3 локалітети: вздовж дороги „Полтава-Кротенки” (в самому с. Кротенках і в с. Патлаївка), неподалік кінцевої зупинки "Левада" в Полтаві та залізничної ст. "З км" за с. Копили.

Pið Hieracium L. – нечуйвітер

H. glomeratum (Naeg. et Peter) Juxip – *н. скучений*. На сухих луках. РПО:8 (Сумська обл.), 11 (Харківська обл.). Знайдений на узліссях листяних лісів за с. Тютюнники. Малочисельна група. Новий для флори Полтавщини.

H. heothinum (Naeg. et Peter) Juxip – *н. східний*. На пісках. РПО:8 (Сумська обл.). Зрідка. Знайдений на піскуватих луках за с. Марківка (неподалік ст. Микільське) та за Микільським переїздом. Новий для флори Полтавщини.

H. pratense Tausch – *н. лучний*. На луках. ПДО:2. Наводиться у літературі. Поодинокі особини відмічені на узліссях соснових лісів за с. Копили і Микільське та на схилах поблизу с. Кротенки. Зрідка.

H. thausium (Peter) Juxip – *н. дивний*. На узліссях соснових лісів. Поодинокі особини знайдені за с. Копили поблизу дороги на с. Макухівку (Чалівське л-во, кв.27). Зрідка. Новий вид для флори Полтавщини.

Pið Inula L. – оман

I. ensifolia L. – *о. мечолистий*. На відкритих сухих ділянках. РПО:9. ПДО:1,4. Зрідка. Одну особину знайдено у 2004 р. на степових схилах між селами Абазівка і Рожаївка, але в наступні роки підтвердити цю знахідку не вдалося.

Pið Jurinea Cass. – юринея

**J. pseudocyanoides* Klok. – *ю. несправжньоволошковидна*. На борових пісках. РПО:8. ПДО:1,2,3. Зрідка. Чисельні локуси цього виду знайдені у лісах Чалівського (села Вовківка, Триби, Микільське) та Руднянського (села Вакуленці, Кованьків, ліс Рудне) лісництв.

Pið Lactuca L. – латук

L. saligna L. – *л. солончаковий*. На солончакових луках. РПО:11. ПДО:3. Спорадично. Зростає на лівому березі р. Коломак (район міста Полтави Лісок) та по р. Полузір'я (с. Абазівка). Крім того, цей вид може зростати і на забур'янених ділянках (села Вовківка, Мачухи), в посівах (район міста Полтави Гора), на узліссях і схилах (села Вороніно, Мачухи), як домішка до *L. serriola*.

L. tatarica C. A. Mey – *л. татарський*. На солонцях. ПДО:3,4. Зрідка в Полтавському районі зростає як бур'ян в околицях Полтави в невеликій кількості (майже всюди, але поодиноко чи нечисельно), а також на солонцоватих луках за селами Абазівка та Буланове.

Pið Leontodon L. – любочки

L. pratensis (Less.) Reichenb. – *л. лучні*. На лісових галевинах. Невелика група особин виявлена у 2004 р. в Розсошенському лісництві поблизу с. Пожежна Балка. Зрідка. Новий вид для флори Полтавщини.

Pið Senecio L. – жовтозілля

S. paucifolius S. G. Gmel. – *ж. небагатолисте*. На солонцоватих луках. РПО:9. ПДО:3,4. Зрідка. Поодинокі особини цього виду були виявлені на степових схилах в Рожаївському ботанічному заказнику та поблизу с. Мачухи.

Pið Serratula L. – серпій

S. heterophylla (L.) Desf. – *с. різнолистий*. На сухих луках, схилах, узліссях. ПДО:4. РПО:8 (Сумська обл.). Спорадично. Виявлені чисельні групи поблизу м. Полтави (район міста Полтави Вороніно).

КЛАС LILIOPSIDA – ОДНОДОЛЬНІ

ПОРЯДОК NAJADALES – НАЯДОЦВІТІ

РОДИНА NAJADACEAE – НАЯДОВІ

БОТАНІКА

Pið *Najas* L. – наяда, різуха

N. marina L. – н. морська. У солонцюватих водоймах з мулисто-піщаними відкладами. ПДО:4. Зрідка (гирло р. Ворскла). Виявлена по р. Ворсклі нижче м. Полтави (за с. Нижні Млини).

ПОРЯДОК IRIDALES – ПІВНИКОЦВІТІ

РОДИНА IRIDACEAE – ПІВНИКОВІ

Pið *Iris* L. – півники

**I. pumila* L. – п. карликові. На степових схилах. РПО:8,9,11. ПДО:1, 3,

4. Зрідка. Виявлені між селами Абазівка та Рожаївка (поблизу соснових насаджень).

ПОРЯДОК CYPERALES – ОСОКОЦВІТІ

РОДИНА CYPERACEAE – ОСОКОВІ

Pið *Carex* L. – осока

C. caryophyllea Latourr. – о. весняна. На степових схилах, суходільних луках, узліссях. РПО:9,11. Спорадично. Виявлені місцевонаходження: район міста Полтави Лісок, с. Кротенки, Рожаївський ботанічний заказник.

C. digitata L. – о. пальчаста. У листяних і змішаних лісах. РПО:7, 9. БО:5. Спорадично. Поодинокі особини трапляються у лісах Розсошенського (села Вел. Тростянець, Пожежна Балка, Буланове) та Чалівського (сеа Копили, Зінці) лісництва.

C. elongata L. – о. видовжена. У вільшняках, на осокових болотах. ПДО:4. Зрідка (пониззя річок Псла і Ворскли). Виявлена в пониззі р. Коломак поблизу с. Копили. Трапляється зрідка.

C. leporina L. – о. заяча. У лісах, на луках. РПО:8, 9. ПДО:4. Спорадично. Поодинокі особини зростають у с. Вакуленці та в лісах Чалівського лісництва (кв. 39, 45, 48).

ПОРЯДОК POALES – ТОНКОНОГОЦВІТІ

РОДИНА POACEAE – ЗЛАКОВІ

Pið *Agropyron* Gaertn. – житняк

A. laurenkoanum Prokud. – ж. Лавренка. На прирічкових пісках по берегах р. Ворскла. РПО:10. Зрідка. Наводиться в літературі. Виявлений поблизу с. Терешки, біля залізниці.

Pið *Cenchrus* L. – ценхрус

C. pauciflorum Benth. – ц. малоквітковий. На забур'янених місцях. У 2003 р. було знайдено малоочисельну популяцію цього заносного виду в м. Полтава (неподалік нового корпусу ПДПУ), хоча в наступному році це місцевонаходження не підтверджено і цей вид, мабуть, зник. Новий вид для флори Полтавщини.

Pið *Crypsis* Ait. – скритниця

C. aculeata (L.) Ait. – с. колюча. На солонцюватих луках. Часто в ПДО. Також зростає на лівому березі р. Коломак (район міста Полтави Лісок). Крім цього, виявлена на прирічкових пісках Ворскли за с. Нижні Млини та Буланове, а також у канаві з піщаним ґрунтом між с. Буланове та Сапожино. Скрізь трапляється зрідка.

Pið *Leymus* Hochst. – колосняк

L. sabulosus (Bieb.) Tzvel. – к. чорноморський. На пісках. Виявлений в гирлі р. Коломак та вздовж залізниці поблизу переїзду за Інститутом зв'язку. Рослина заносна. Новий вид для флори Полтавщини.

Pið *Stipa* L. – ковила

***S. graffiana* Stev. (*S. pulcherrima* C. Koch) – к. Граффа. На степових схилах. РПО:9 (Сумська обл.), 10 (ДРЛП), 11. БО:5. Зрідка. Невеликі зарости цього виду знайдено на степових ділянках між селами Абазівка і Рожаївка. Виявлений локус потребує охорони.

Про місцевростання таких рідкісних видів, як *Lathyrus venetus* та *Sympytum tauricum* ми повідомляли раніше [2, 3].

На жаль, під час досліджень флори Полтавського району нам не вдалося виявити ряд видів, вказаних у "Конспекті ...", зокрема у його картосхемах для цієї території. До таких видів належать *Allium ursinum* L., *Listera ovata* R. Br., *Neottia nidus-avis* (L.) Rich (Розсошенське лісництво), *Delphinium cuneatum* Stev. ex DC. (урочище поблизу с. Триби), *Bellevalia sarmatica* (Pall.) Woron. тощо. Тому ми проведемо подальші дослідження з метою підтвердження або спростування інформації щодо поширення згаданих видів в околицях м. Полтави.

Незважаючи на такі вражаючі дані (90 видів-доповнень до "Конспекту..."), мабуть, в подальшому в околицях Полтави можуть бути виявлені види, не наведені у цьому джерелі. Наприклад, у "Флорі..." С.О.Іллічевського наводено літературні дані щодо поширення на цій

БОТАНІКА

території видів *Lycopodiella inundata* (L.) Holub, *Adonis wolgensis* Stev., *Rosa rubiginosa* L., *Dictamnus albus* L. та ряд інших, що потребує підтвердження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Байрак О.М. Конспект флори Лівобережного Придніпров'я. Судинні рослини. – Полтава: Верстка, 1997. – 162 с.
2. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Поширення *Lathyrus venetus* (Mill.) Wohlf на території Полтавської області // Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття. Матеріали конференції молодих учених – ботаніків (6-9 вересня 2005 р., м. Умань, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України). – К., Фітосоціоцентр, 2005. – С. 47-49.
3. Давидов Д.А., Гомля Л.М. *Sympytum tauricum* Willd. на Полтавщині // Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного та тваринного світу. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. – Кривий Ріг, 2006. – С. 88.
4. Іллічевський С.О. Флора околиць Полтави (з повним списком дикої рослинності). – Полтава: "Полтава-Поліграф", 1-а райruk., 1927. – 32 с.

Gomlya L. M., Davydov D. A.

ADDITION TO "THE SUMMARY OF FLORA OF THE LEFT-BANK OF THE DNIEPER RIVER" OF POLTAVA REGION

The results of floral research of 2003-2006 years are given in the article. The new species of plants, added to the previous research of Poltava's territory are disclosed.

Надійшла 25.01.2006 р.

УДК 634.1.581

Н. В. Мельниченко

Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601

КРИТИКО-СИСТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОДУ SORBUS L.

Вид, рід, родина, підродина, секції, підсекції, таксони, системи, філогенетичні зв'язки, горобина

Серед значної кількості аборигенних та інтродукованих деревних плодово-ягідних порід особливий інтерес в науково-історичному відношенні становить рід горобина (*Sorbus* L.) родини Розові (Rosaceae Juss.), підродини Яблуневі (Maloidea Focke).

В підродині Maloidea одним із заплутаних і складних в таксономічному відношенні родів є *Sorbus* L.

Широке морфологічне варіювання ознак вегетативних і генеративних органів, досить часто зустрічається явище інтрогресивної гібридизації з наступними апоміксисом і поліплоїдією, а також еволюційна гетеробатмія ознак, які надто ускладнюють дослідження систематичних і філогенетичних взаємозв'язків всередині роду. З цієї причини, починаючи з часів К.Ліннея, різні ботаніки-систематики або об'єднують окремі секції даного роду, або рід *Sorbus* L. об'єднують в цілому з іншими родами Maloidea, або ж ділять його, підносячи секції до рангу роду [4, 12, 13].