

ТИПІФІКАЦІЯ ВИДІВ СУДИННИХ РОСЛИН, ОПISАНИХ З УКРАЇNI: РОДИНИ THYMELAEACEAE JUSS., LYTHRACEAE ST.-HIL., RUTACEAE JUSS., ACERACEAE JUSS., LINACEAE DC. ex S.F. GRAY, GERANIACEAE JUSS., POLYGALACEAE LINDL., CELASTRACEAE R. BR., SANTALACEAE R. BR.

таксономія, тип виду, базіонім, голотип, лектотип, ізотип, неотип, *Thymelaeaceae*,
Lythraceae, *Rutaceae*, *Aceraceae*, *Linaceae*, *Geraniaceae*, *Polygalaceae*, *Celastraceae*, *Santalaceae*

У статті наведено список видів родин Thymelaeaceae Juss. (1), Lythraceae St.-Hil. (5), Rutaceae Juss. (5), Aceraceae Juss. (1), Linaceae DC. ex S.F. Gray (11), Geraniaceae Juss. (7), Polygalaceae Lindl. (6), Celastraceae R. Br. (4), Santalaceae R. Br. (2), описаних з території України. На основі критичного перегляду літературних даних та гербарних матеріалів проведено їх типіфікацію.

Описи нових для науки таксонів згаданих родин флори України зроблені в XIX ст. В. Бессером, Ф. Біберштейном, Х. Стевеном, а також К. Вільденсом, А. Декандолем, Е. Слахом та ін, у XX ст. — К. Захаріаді, М. Клоковим, Т. Савулеску, М. Цвельзовим, С. Юзепчуком та ін.

Для кожного з видів вказуються базіонім, основна синоніміка, а також номенклатурний тип (цитування протологу або голотипу, лектотипу чи неотипу) та місце його зберігання. В окремих випадках замість конкретного номенклатурного типу наводяться автентичні зразки. Тип подається згідно з оригінальним описом зі збереженням старих назв адміністративних пунктів.

THYMELAEACEAE Juss.

Daphne L.

1. *D. taurica* Kotov, 1970, Ботан. журн., 55, 9: 1336; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 150; Победимова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 289.

Тип: «Крымская обл., северный макросклон I гряды, Переяльное лесничество, кв. II, урочище Яман-Таш, по р. Б. Бурульча, лес на юрских известняках, 29.05.1969, М. Котов» (*KW*, голотип, ізотипи; *LE*, ізотипи).

LYTHRACEAE St.-Hil.

Lythrum L.

1. *L. sophiae* Klokov, 1946, Ботан. журн. АН УРСР, 3, 1-2: 25; Klokov, 1955, Фл. УРСР, 7: 403; Муравьева, 1949, Фл. СССР, 15: 541, pro syn. *L. tribracteatum* Salzm.; Победимова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 294, pro syn. *L. microphyllum* Kar. et Kir.

Тип: «*Lytrum tribracteatum* Salzm. Край В. Чапельського пода, Меліт. округи, 15.07.1928, Н. Осадча, №539» (KW, голотип).

Примітка. За протологом типом виду є «RSS Ukr., Ascania-Nova, «Chapelskij Pod», loco humido. 05.07.1922, leg. E. Lavrenko» (CWU), але за голотип М. Клоков з невідомих причин образ зразок, зібраний Н. Осадчою.

2. *L. hybridum* Klokov, 1955, Фл. УРСР, 7: 633, 404, рис. 66 (Б); Цвєлев, 1984, Нов. системат. высш. раст., 21: 241; Победимова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 294, pro syn. *L. melanospermum* Savul. et Zahar.

Тип: «УРСР. Надозів'я, Маріупольська округа. С. Чермалик — с. Карань. Тернова балка до рч. Кальміюса. Рівчик в гранітах. 24.07.1925, Ю. Клеопов» (KW, голотип).

3. *L. melanospermum* Savul. et Zahar. 1934, in Savulescu et Rayss, Mat. Fl. Basarab.: 185, tab. 36; Клоков, 1955, Фл. УРСР, 7: 406; Цвєлев, 1993, Нов. системат. высш. раст., 29: 139; Победимова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 294.

Тип: «*Habitat prope vicum Valkov, in arenosis humidis*» (BUC).

Peppis L.

1. *P. alternifolia* M. Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 277; Klokov, 1955, Фл. УРСР, 7: 398; Победимова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 296.

Тип: «*Peppis alternifolia* MB. ad Borysthenem, circa Kremenschug, m. M. Bieberstein, 1824» (LE, лектотип).

2. *P. borysthenica* M. Bieb. ex Schrank, 1822, Flora (Regensb.), 5: 643. — *Lythrum borysthenicum* (M. Bieb. ex Schrank) Litv. 1917, в: Маевский, Фл. Сред. Рос., изд. 5: 209; Klokov, 1955, Фл. УРСР, 7: 400, cum auct. Schrank. — *Middendorfia borysthenica* (M. Bieb. ex Schrank) Trautv. 1842, Mem. Pres. Acad. Sci. Petersb. Div. Sav. 4: 489; Победимова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 295.

Тип: «*Peppis borysthenica* MB. ad Borysthenem m. M. Bieberstein, 1824» (LE, лекто-тип, ізолектотип).

RUTACEAE Juss.

Haplophyllum A. Juss.

1. *H. biebersteinii* Spach, 1847-1850, in: Jaubert et Spach, Ill. Pl. Or., 3: 79; id., 1849, Ann. Sc. Nat. Ser., 11: 178; Введенский, 1949, Фл. СССР, 14: 208, pro syn. *H. ciliatum* Griseb.; Доброчаєва, 1955, Фл. УРСР, 7: 87, pro syn. *H. ciliatum* Griseb.

Тип: «*Crescit Bessarabia (herb. Webb.)*» (P).

2. *H. besseri* Spach, 1849, Ann. Sc. Nat. Ser., 11: 178; Введенский, 1949, Фл. СССР, 14: 208, pro syn. *H. ciliatum* Griseb.

Тип: «*Crescit Bessarabia ([leg. J. Besser])*» (P).

3. *H. tauricum* Spach, 1847-1850, in: Jaubert et Spach, Ill. Pl. Or., 3: 79; id., 1849, Ann. Sc. Nat. Ser., 11: 178; Введенский, 1949, Фл. СССР, 14: 207, pro syn. *H. suaveolens* (DC.) G. Don; Доброчаєва, 1955, Фл. УРСР, 7: 89, pro syn. *H. suaveolens* (DC.) G. Don.

Тип: «*Tauria legit cl. Godet*» (P).

Dictamnus L.

1. *D. gymnostylis* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 1: 333; Введенский, 1949, Фл. СССР, 14: 231; Доброчаєва, 1955, Фл. УРСР, 7: 91.

Тип: «*In sylvaticis frequens; idem in campus ad rivum Kaltschik Maeotidem influentem*» (H).

Ruta L.

1. *R. suaveolens* DC., 1824, Prodr., 1: 711. — *Haplophyllum suaveolens* (DC.) G. Don,

1831, Gen. Syst., 1: 780; Введенский, 1949, Фл. СССР, 14: 207; Доброчаева, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 213; Линчевский, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 333; Доброчаева, 1955, Фл. УРСР, 7: 87, pro syn. *H. ciliatum* Griseb.

Тип: «In Tauriae et Bessarabiae apricis» (P).

ACERACEAE Juss.

Acer L.

1. *A. stevenii* Pojark., 1933, Тр. Ботан. ин-та АН СССР, сер. 1, 1: 142; Пояркова, 1949, Фл. СССР, 14: 614; Цвелев, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 343.

Тип: «Tauria inter Phoros et Muhalatka, in silvis montanis» (LE).

LINACEAE DC. ex S.F. Gray

Linum L.

1. *L. basarabicum* (Savul. et Rayss) Klokov et Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 133; Доброчаева, 1955, Фл. УРСР, 7: 67; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 351. — *L. flavum* L. subsp. *tauricum* Willd. var. *basarabicum* Savul. et Rayss., 1934, Mat. Fl. Basarab., 3: 140.

Тип: «Hotin, pe Valul lui Traian VII; Noua-Sulita, coaste cu stepa; Corpaci, stepa VI-VII; Ocnita, poieni VI; Vertuijeni, coaste cu stepa VI; Balti, stepa VI; Cobalnia, stepa pe coaste VI; Capresti, coaste cu stepa VI; Ciocalteni, coaste cu stepa VI; la NE de Petrusani VII; Hancesti, fanele VI; Baimaclia, fanete stepice VI; Manzir, silvostepa VI; Zloti, poieni in silvostepa de aci VI; Purcaru, coaste cu stepa VI; Leontievo, poieni in silvostepa de aci VI; Vulcanesti, pe Valul lui Traian VI; Comrat, coaste cu stepa VI» (BUCA).

2. *L. czernjaevii* Klokov, 1946, Ботан. журн. АН УРСР, 3, 1-2: 24; Доброчаева, 1955, Фл. УРСР, 7: 72; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 353.

Тип: «*Linum ucrainicum* Czern. Сталинская обл., окр. г. Амвросиевки, у с. Белояровки, на мергелистом склоне Белого яра. 09.06.1969, М. Котов, О. Осетрова, Н. Глаголова» (KW, неотип).

Примітка. Гербарний зразок, зазначений у протолозі як тип: «Prov. Stalinensis pro pag. Bjelojarovka, in cretaceis ad. fl. Krynta, 09.06.1930, leg. M. Klokov», що зберігався у Гербарії CWU, не знайдено.

3. *L. jailicola* Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 713, 93; Е. Вульф, 1953, Фл. Крыма, 2, 3: 29; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 356.

Тип: «... in jaily Babugan, 23.07.1946, №207, S. Juzeprczuk» (LE, неотип).

Примітка. Неотип вибрала Т. Егорова на основі того, що цитований у протолозі екземпляр, який зберігається в Гербарії LE, «ex jaila Ai-Petri» не тестований С. Юзепчуком як автором виду, що, на нашу думку, є зайвим.

4. *L. euxinum* Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 721, 118; Доброчаева, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 218; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 354, pro syn. *L. squamulosum* Rudolph ex Willd.

Тип: «Sebastopolis (cl. S. Korshinsky)» (LE, голотип).

5. *L. lanuginosum* Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 723, 143; Доброчаева, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 217; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 358, pro syn. *L. hirsutum* L. subsp. *lanuginosum* (Juz.) Egor.

Тип: «Симферополь, ближние Дубки ...» (LE, голотип).

6. *L. linearifolium* (Lindem.) Jav. 1910, Mag. Bot. Lapok, 9: 156; Юзепчук, 1949, Фл. СССР, 14: 133; Доброчаева, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 217; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 352. — *L. tauricum* Willd. var. *linearifolium* Lindem. 1881, Fl. Cherson., 1: 102.

Тип: «In argillosis herbidis circa Odessam. №56. Lang et Szovits» (W, лектотип; LE, ізолектотип).

7. *L. marschallianum* Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 721, 120; Доброчаева, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 218; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 355.

Тип: «Крым. Государственный заповедник близ Алушты, каменистая осыпь Аунда над Гурзуфом, 19.06.1926, №56, Н. Троицкий, Г. Поплавская» (LE, лектотип).

8. *L. pallasianum* Schult., 1820, in Roemer et Schultes, Syst. Veget., 6: 358; Юзепчук,

1949, Фл. СССР, 14: 132; Доброчаєва, 1987, Опред. висш. раст. Укр.: 217; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 352.

Тип: «In Chersones heracleotico» (M?).

9. *L. squamulosum* Rudolph ex Willd., 1809, Enum. Horti Bot. Berol.: 338; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 354.

Тип: «Ex sem. tauricis (in Chersoneso taurico collectis) et a cl. Pallas sub. nom. Linia Narbonensis missis. Hort. Gryph. 804» (MW, in herb. Trinius №1399, лектотип).

10. *L. tauricum* Willd., 1809, Enum. Berol.: 339; Юзепчук, 1949, Фл. СССР, 14: 131; Доброчаєва, 1987, Опред. висш. раст. Укр.: 217; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 351.

Тип: «... in apricis Tauriae et ad Caucasus» (B.).

11. *L. ucrainicum* (Griseb. et Planch.) Czern. 1859, Консп. раст. окр. Харк.: 12; Доброчаєва, 1955, Фл. УРСР, 7: 71; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 353, pro syn. *L. ucrainicum* (Griseb. et Planch.) Czern. subsp. *ucrainicum*. — *L. flavum* L. var. *ucrainicum* Griseb. et Planch., 1848, London Journ. Botan., 7: 509, p.p.

Тип: «in Thracia (an non etiam in Ucrainia, ut nomine intelligitur)» (LE).

Примітка. При цитуванні типу Т. Егорова помилилася: за тип вона вказує Північну Грецію та Україну («Сев. Греція (Фракія) и Украина». «Фракія» («Thracia») — це, найімовірніше, грецька колонія в Північному Причорномор'ї, оскільки сам А. Грізебах мав сумнів у приналежності даної назви до Греції: «in Thracia (an non etiam in Ucrainia, ut nomine intelligitur)». Про це свідчить також наведений Т. Егоровою ареал виду, який географічно віддалений від Греції: «Ц. (Волж.-Дон: юг. и вост.); З. (Дніпр.: юг. и вост. Причорн.: вост.); В. (Нижн.-Дон: сев.)».

Примітка. Із суміжної з Україною території Словаччини описано *Linum extraaxillare* Kit., 1864, Linnaea, 32: 573 (тип: «E Scepusio», зберігається в Гербарії BP), паратип якого відомі з гори Піп-Іван (цит. за «Флора СССР», 1949, 14: 115).

GERANIACEAE Juss.

Erodium L.

1. *E. beketowii* Schmalh. 1895, Фл. Ср. и Южн. Рос., 1: 198; Доброчаєва, 1955, Фл. УРСР, 7: 31; Цвєлев, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 386.

Тип: «Herb. Eug. Bordzilowski. Flora Rossica Exsiccata. *Erodium beketowi* n. sp. На порфіровій скалі при р. Кальмиус против села Каракуба. 26 июня 1893 г. И. Шмальгаузен» (LE, голотип ?).

2. *E. cyconioides* Tzvelev, 1993, Нов. системат. висш. раст., 29: 97; Цвєлев, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 386.

Тип: «Окр. Симферополя, в садах, около забора и на парковых полях, 12.04.1901, Е. Исполатов» (LE, голотип ?).

3. *E. ruthenicum* M. Bib., 1819, Pl. Rar. Cent. Merid., 1: tab. 48; Доброчаєва, 1955, Фл. УРСР, 7: 35; Цвєлев, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 386.

Тип: «Herb. Ledebour. *E. ruthenicum* Bib. [...] Pl. [...] 48» (LE, лектотип ?).

Примітка. На етикетці автентичного гербарного екземпляра, обраного М. Цвєльовим за тип («Typus. Н. Цвєлев, 1991, IV», locus classicus виду не вказується; за протологом наведено «In deserto Bessarabiae inter Tyram a. Hypanis».

4. *E. serotinum* Steven, 1811, Mem. Acad. Petersb., 3: 297, tab. 15, f. 2.; Доброчаєва, 1955, Фл. УРСР, 7: 35, pro syn. *E. ruthenicum* M. Bib.

Тип: «occurred in campis versus mare nigrum, inter Odessam et Thryam fluvium; in valle humida ad rivum Kutschurgan copiose, in campo elato in vicinia urbis Bender rarius» (H).

Примітка. В Гербарії LE зберігається три гербарні зразки, які, без сумніву, є автентичними, але на жодному з них не вказано конкретне місце збору, яке б повністю відповідало протологу, а зазначено «... Podol. austr.».

Geranium L.

1. *G. radicum* M. Bibb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 134; Бобров, 1949, Фл. СССР, 14: 60, pro syn. *G. tuberosum* L.; Доброчаєва, 1955, Фл. УРСР, 7: 31, pro syn. *G. tuberosum* L.; Цвєлев, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 380, pro syn. *G. tuberosum* L.

Тип: «*Geranium radicum m. ex Tauria*» (*LE*, лектотип ?).

2. *G. sibiricum* L. subsp. *popovii* Tzvelev, 1993, Нов. системат. высш. раст., 29: 96; Цвелеv, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 379.

Тип: «Дубовый лес в парке Александрия близ г. Белая Церковь» (*LE*, голотип).

3. *G. tauricum* Rupr., 1869, Mem. Ac. Imp. Sci. Petersb. (Sci. Phys. Mat.), ser. 7, 15, 2: 268 (Fl. Cauc.); Бобров, 1949, Фл. СССР, 14: 50; Бойко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 221; Цвелеv, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 380, pro syn. *G. asphodeloides* Burm. fil.

Тип: «*Geranium. Tauria. Compere acc. a D. Prescott. 1832*» (*LE*, лектотип).

POLYGALACEAE R. Br.

Polygala L.

1. *P. andrachnoides* Willd., 1800, Sp. Pl., 3: 875; Невский, Тамамшян, Котов, 1949, Фл. СССР, 14: 255; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 223.

Тип: «habitat in Armeniae glareosis inque Tauriae montosis» (*B*)

2. *P. carpatica* Wol., 1888, Spraw. Kom. Fizjogr., 22, 2: ?.

Тип: «In locis aridis solo calcarea in ditione Preluk (1570 m) et in cacumine montis Popadja Czeremoszica (1520 m) et ad pedem montis Czywczyn 1580 m s.m. haud copiosa» (*KRAM*).

Примітка. Забутий вид, в літературі не цитується навіть у синоніміці.

3. *P. decipiens* Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 73; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 104; він же, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 224.

Тип: «*Polygala decipiens*. In uliginosum Volnyn» (*KW*, лектотип).

4. *P. podolica* DC., 1824, Prodri., 1: 325; Невский, Тамамшян, Котов, 1949, Фл. СССР, 14: 261, in adnot. ad *P. comosa* Schkuhr; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 110.

Тип: «in Podolia australi» (*G*).

5. *P. vaillantii* Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 73; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 106, pro syn. *P. vulgaris* L. — *P. vulgaris* var. «*β*» Besser, 1809, Prim. Fl. Galic., 2: 104.

Тип: «*Polygala minor*, vulgaris flore coeruleo vel albo. Vaill. Bot. Par., t. 32. f. r. *Polygala vaillantii* mihi» (*KW*, лектотип).

Примітка. В протологах *P. vaillantii* та *P. vulgaris* var. «*β*» не вказано конкретне місцезнаходження: «in collibus apricis; in lacum haec mixtim et in pratis humidis occurrit» (Prim. Fl. Galic., 1809).

6. *P. wolfgangiana* Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawłowski, 1924, Rosl. Polskie: 325; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 107, sine auct. Szafer, Kulcz. et Pawłowski; він же, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 224, sine auct. Szafer, Kulcz. et Pawłowski.

Тип: «*P. Bial., Wilenszcz., Wol.*, zapewne gdziendziej na wsch.» (*KRAM*).

Примітка. Тип процитовано за протологом. В колекції В. Бессера (*KW*) є три екземпляри цього виду (один — з Литви, два — з околиць Києва), які проблематично вважати автентичними. Лектотип, ймовірно, знаходиться в Krakovi.

CELASTRACEAE R. Br.

Euonymus L.

1. *E. czernjaevii* Klokov, 1959, Ботан. мат-лы (Ленінград), 19: 301; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 240.

Тип: «*Euonymus europea*. Донбас. Макіївський р-н, радгосп «Заря», середня частина схилу, відроги балки Скелевої, 03.06.1932, Л. Морозова» (*KW*, голотип; *LE*, ізотип).

2. *E. odessana* Klokov, 1959, Ботан. мат-лы (Ленінград), 19: 284; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 240, pro syn. *E. czernjaevii* Klokov.

Тип: «*Euonymus pontica* (Savul. et Rayss) Klok. Одеса, р-н, Алтестово—Хол. Балка. Правий берег Хаджибейського лиману. 04.06.1951, М. Клоков» (*KW*, голотип; *LE*, ізотип).

3. *E. pubescens* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 3: 121, in adnot. ad *E. europaea* L.; Клоков, 1959, Ботан. мат-лы (Ленінград), 19: 310.

Тип: «*E. pubescens* mihi ...» (LE, ізолектотип?).

Примітка. Х. Стевен при описі виду конкретне місцезнаходження не наводить, а порівнює волинські рослини з кавказькими: «*Stirpis volhynicae folia subtus pubescent. Caucasicae vero glaberrima pedunculis etiam longiusculis ...*». В Гербарії LE є лише один автентичний (вищечитований) зразок, на етикетці якого олівцем дописано «Крим». Т. Леонова визнала його, ймовірно, за типовий («*Turpis*? 1961 Т. Леонова»).

4. *E. suberosa* Klokov, 1959, Ботан. мат-лы (Ленінград), 19: 284; Котов, 1987, Опред. вищ. раст. Укр.: 240, pro syn. *E. europaea* L.

Тип: «Черновицька обл., Заставнівський р-н, окр. с. Стефановка (Стефанешти), поросши кустарником склони карстової воронки («вертеп»), 13.05.1952, М.В. Клоков, І.В. Артемчук» (LE, ізотип).

Примітка. У Гербарії KW зразок, вибраний авторами виду за голотип, відсутній. Тут знаходяться лише екземпляри, які належать до паратипів: «*Euonymus europaea* L. Чернівецька обл., Заставнівський р-н. В одному вертепі. 14—15.05.1952, М.К., I.A.».

SANTALACEAE R. Br.

Thesium L.

1. *T. caespitans* (Ledeb.) Tzvelev, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 406. — *T. ramosum* Hayne var. *caespitans* Ledeb. 1851, Fl. Ros. 3, 2: 541; Бордзіловський, Лоначевський, 1952, Фл. УРСР, 4: 182, рис. 31.

Тип: «*Thesium ramosum* var. *caespitans* Ledeb. Odessa. Herb. Ledebour» (LE, голотип).

2. *T. diffusum* Andr. ex DC., 1857, Prodr., 14: 644; Бордзіловський, Лоначевський, 1952, Фл. УРСР, 4: 186, pro syn. *T. procumbens* C.A. Mey.; Цвєлев, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 406, pro syn. *T. procumbens* C.A. Mey.

Тип: «*Thesium ramosum*. E Podol. austr. 1818.» (KW, лектотип, LE, паратип; G, паратип).

Примітка. У літературі наводиться ще один вид з порядку Santalales (*Loranthaceae* Juss.) — *Viscum nervosum* Andr., прийнятий П. Роговичем (1869, Обозр. семен. и высш. спор. раст. ...: 252) за синонім *V. album* L. «*φ latifolium*», який, проте, не має опису, але вказується для околиць Ставища: «На івах около Ставища, сел. Бруссии, Полт. уезда и Ямполя». Інші автори (Федченко, 1936, Фл. СССР, 5: 411; Бордзіловський, Лоначевський, 1952, Фл. УРСР, 4: 174) також цитують цей вид як синонім *V. album* L. з посиланням на П. Роговича.

Рекомендую до друку
Б.В. Заверуха

Надійшла 09.08.1999

Л.И. Крицкая, Н.М. Федорончук, М.В. Шевера

ТИПИФІКАЦІЯ ВІДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ОПИСАННЫХ С УКРАЇНОЮ: СЕМЕЙСТВА THYMELAEACEAE JUSS., LYTHRACEAE ST.-HIL., RUTACEAE JUSS., ACERACEAE JUSS., LINACEAE DC. ex S.F. GRAY, GERANIACEAE JUSS., POLYGALACEAE LINDL., CELASTRACEAE R. BR., SANTALACEAE R. BR.

Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного НАН України, г. Київ

Приведен список видов семейств Thymelaeaceae Juss., Lythraceae St.-Hil., Rutaceae Juss., Aceraceae Juss., Linaceae DC. ex S.F. Gray, Geraniaceae Juss., Polygalaceae Lindl., Celastraceae R. Br., Santalaceae R. Br., описаних з території України. Для кожного вида указаны основная синоніміка, номенклатурний тип (по прототипу или голотип, лектотип, ізотип, неотип) і місце його зберігання.

L.I. Krytska, M.M. Fedoronchuk, M.V. Shevera

TYPIFICATION OF SPECIES OF VASCULAR PLANTS DESCRIBED FROM UKRAINE: FAMILIES THYMELAEACEAE JUSS., LYTHRACEAE ST.-HIL., RUTACEAE JUSS., ACERACEAE JUSS., LINACEAE

DC. ex S.F. GRAY, GERANIACEAE JUSS., POLYGALACEAE LINDL., CELASTRACEAE R. BR.,
SANTALACEAE R. BR.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The list of species of vascular plants of the families Thymelaeaceae Juss., Lythraceae St.-Hil., Rutaceae Juss., Aceraceae Juss., Linaceae DC. ex S.F. Gray, Geraniaceae Juss., Polygalaceae Lindl., Celastraceae R. Br., Santalaceae R. Br., described from Ukraine. The following data are provided: basionym, original nomenclatural citation; according protology or holotype, lectotype, isotype, neotype; herbarium (-a) at which the specimen(s) is/are deposited.