

**ТИПІФІКАЦІЯ ВІДІВ СУДИННИХ РОСЛИН, ОПИСАНИХ З УКРАЇНИ:
РОДИНИ ONAGRACEAE JUSS., TRAPACEAE DUMORT.,
ASCLEPIADACEAE LINDL., CONVOLVULACEAE JUSS., CUSCUTACEAE
DUMORT., BORAGINACEAE JUSS.**

*таксономія, тип виду, базіонім, голотип, лектотип, ізотип, неотип, Onagraceae,
Trapaceae, Asclepiadaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Boraginaceae, Україна*

У статті наведено список видів родин Onagraceae Juss. та Cuscutaceae Dumort. (по 1 виду), Trapaceae Dumort. (4 види), Asclepiadaceae Lindl. (9 видів), Convolvulaceae Juss. (6), Boraginaceae Juss. (45 видів), описаних з України, проведена їх типіфікація на основі аналізу першоописів видів та критичного вивчення автентичних зразків.

Найбільш ранні відомості про новоописи видів згаданих родин є у класичних працях А. Анджейовського, Ф. Біберштейна, В. Бессера, К. Ліннея (*Luxospis orientalis* L.), Х. Стевена (Boraginaceae), Ф. Біберштейна, Х. Стевена (Convolvulaceae). У новішій літературі описи нових видів цих родин знаходимо у працях В. Васильєва і Д. Доброчаєвої (Trapaceae), Ю. Клеопова, В. Остапка, Є. Победімової, С. Юзепчука (Asclepiadaceae), С. Юзепчука (Convolvulaceae), Д. Доброчаєвої, Б. Заверухи, М. Клокова, М. Попова (Boraginaceae) та ін. За сучасними монографічними обробками видовий статус більшості описаних з України таксонів підтверджений; деякі з них залишаються критичними.

Для кожного виду вказуються базіонім, основна синоніміка, а також номенклатурний тип (цитування протологу або голотипу, лектотипу, ізотипу чи неотипу) та місце його зберігання. В окремих випадках замість конкретного номенклатурного типу наводяться автентичні зразки. Тип подається згідно з оригінальним описом зі збереженням старих назв адміністративних пунктів.

ONAGRACEAE JUSS.

Epilobium L.

1. *E. dominii* Popov, 1949, Очерк раст. и фл. Карпат: 296; Скворцов, 1986, Фл. Вост. Евр., 9: 308, pro syn. *E. adenocaulon* Hausskn.

Тип: «In Carpatis orientalibus (Silvaticis Waldkarpaten), in montium jugo Czerna Hora (Montes nigrae) dicto, radices septentrionales ad cacumenis Petros (ch), ad rivulum Lopuszanka regiones abietinae fl. fr. 21.07.1946, M.G. Popov; ad fl. Tissa atra (Czerna Tissa) supra pagum Jasina (Korosmezo) in angustiis Dovszina fl. et fr. imm. 25.08.1946, M.G. Popov» (*LWS*, синтаксис).

TRAPACEAE Dumort.

Trapa L.

1. *T. danubialis* Dobrocz. 1955, Фл. УРСР, 7: 635, рис. 77; Цвєлев, 1996. Фл. Вост. Евр., 9: 321, pro syn. *T. pseudocolchica* V. Vassil.

Тип: «Одеська обл., Кілійський р-н, Вилкове. Дельта р. Дунаю, середнє гирло, 18.09.1948, О. Романова» (*KW*, голотип, ізотип).

2. *T. flerovii* Dobrocz. 1955, Фл. УРСР, 7: 634, рис. 75; Цвєлев, 1996. Фл. Вост. Евр., 9: 320. — *T. hungarica* Flerow, 1925, Изв. Гл. ботан. сада АН СССР, 24, 1: 32, р. р., поп. Opiz.

Тип: «Окр. Николаєва. Солониха. В воді среди тростника недалеко от берега, 03.06.1928, П. Опперманн» (*KW*, голотип).

3. *T. macrorhiza* Dobrocz. 1955, Фл. УРСР, 7: 634, рис. 76; Цвєлев, 1996. Фл. Вост. Евр., 9: 321.

Тип: «Окол. Херсона. Річка Конка, недалеко від третьої затоки нижнього Дніпра, 24.08.1948, Д. Доброцаєва» (*KW*, голотип).

4. *T. ucrainica* V. Vassil. 1973, Нов. системат. высш. раст., 10: 209, рис. 2 (6—7); Цвєлев, 1996. Фл. Вост. Евр., 9: 321.

Тип: «Запорожська обл., Каменський р-н, низов'я р. Конки, оз. Зачинай, 20.06.1954, К. Зеров» (*LE*, голотип; *KW*, ізотип).

ASCLEPIADACEAE LINDL.

Antitoxicum Pobed.

1. *A. juzepczukii* Pobed. 1952, Фл. СССР, 18: 752. — *Vincetoxicum juzepczukii* (Pobed.) Privalova, 1956, Тр. Гос. Никит. ботан. сада, 26: 140; Вісколіна, 1957, Фл. УРСР, 8: 280; Победимова, Фл. европ. ч. СССР, 3: 54.

Тип: «Tauria prope m. Czatyrdag in fagetis. 26.05.1898, leg. Golde» (*LE*, голотип).

Cynanchum L.

1. *C. maeticum* Kleopow, 1929, Вісн. Київ. ботан. саду, 9: 70. — *Vincetoxicum maeticum* (Kleopow) Barbar. 1950, Визн. росл. Україн.; Вісколіна, Фл. УРСР, 8: 278; Победимова, 1978, Фл. европ. ч. СССР, 3: 54.

Тип: «Надозів'я. Маріупіль. Степовий схил до р. Кальчика (захисний участок). 30.06.1925, Ю. Клеопов» (*KW*, лектотип).

Vincetoxicum Moench

1. *V. doneticum* Ostapko, 1995, Укр. ботан. журн., 52, 2: 271.

Тип: «Донецкая обл., Амвросиевский р-н, государственный лесной заказник «Бердянский», дубрава в пойме р. Крынки, 19.06.1983, Р.И. Бурда, В.М. Остапко, З.С. Москаленко, О.И. Горлачев» (*KW*, голотип; Гербарий Донецкого ботан. саду (*DNZ*), ізотипи).

2. *V. flavum* Ostapko, 1995, Укр. ботан. журн., 52, 2: 275.

Тип: «Донецкая обл., Славянский р-н, с. Крестище, урочище Музичий лес, 09.07.1992, Р.И. Бурда, В.М. Остапко, С.А. Приходько, В.К. Тохтарь, Т.Г. Зурнаджи, Л.П. Габченко» (*KW*, голотип; Гербарий Донецкого ботан. саду (*DNZ*), ізотипи).

3. *V. intermediate* Taliev, 1900, Тр. о-ва испытат. Харьк. ун-та, 34: 251; Вісколіна, 1957, Фл. УРСР, 8: 279; Победимова, 1978, Фл. европ. ч. СССР, 3: 547.

Тип: «... около Святогорского монастыря..., около с. Белоярка и Кирсановка» (*LE*).

4. *V. jailicola* Juz. 1951, Ботан. мат-лы (Ленінград), 14: 18; Победимова, 1978, Фл. европ. ч. СССР, 3: 56. — *V. laxum* (Bartl.) Gren. & Godr. var. *jailicola* (Juz.) Wissjul. 1958, Фл. УРСР, 8: 258.

Тип: «Демерджи-яйла, 04.08.1948, отцв., незр. пл., Раст. Крыма, N 1103, С. Юзепчук, В. Голубковая (LE, голотип).

5. *V. rossicum* Kleopow, 1929, Вісн. Київ. ботан. саду, 9: 67. Вісюліна, 1957, Фл. УРСР, 8: 280; Победимова, 1978, Фл. европ. ч. СССР, 3: 54.

Тип: «*Vincetoxicum medium Decrisne 1853 corolla intus glabra*, Е-слав. Ар. Н. Войнов» (KW, неотип).

Примітка. За протологом вказано: «... in decliviis inter frutices Ucraina orientali atque in Russia australi (nec non media?)». Цитовані Ю. Клеоповим автентичні зразки в Гербарії KW відсутні, ймовірно загублені. На обраному за неотип гербарному зразку з колекції В. Черняєва (KW) зберігаються дві рослини з Єкатеринославської губернії: одна (з квітками) процитована вище, інша (з плодами) — «Екатеринослав. губ., Александров. уезд, Колчигин».

6. *V. tauricum* Pobed. 1951, Ботан. мат-лы (Ленінград), 14: 282; Победимова, 1978, Фл. европ. ч. СССР, 3: 54.

Тип: «Восточний Крым. Планерское около «Громоотвода» или «Сфинкса» 05.07.1912, цв., незр. пл., В. Траншель» (LE, голотип).

7. *V. uscainicum* Ostapko, 1995, Ukr. ботан. журн., 52, 2: 273.

Тип: «Донецкая обл., Славянский р-н, с. Крестице, урочище Музичий лес, 09.07.1992, Р.И. Бурда, В.М. Остапко, С.А. Приходько, В.К. Тохтарь, Т.Г. Зурнаджи, Л.П. Габченко» (KW, голотип; Гербарій Донецького ботан. саду (DNZ), ізотипи).

CONVOLVULACEAE JUSS.

Convolvulus L.

1. *C. besseri* Spreng. 1825, Syst. Veg. 1: 610. — *C. lineatus* L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 923; Вісюліна, 1957, Фл. УРСР, 8: 300; Смольянінова, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 97.

Тип: «*Convolvulus besseri* Spr.! E Pod. austr. α fol. acutior; β fol. obtusior.» (В, лектотип; KW, ізолектотип).

Примітка. В колекції В. Бессера (KW) зберігається чотири гербарні аркуші, на кожному з яких лежать від двох до чотирьох рослин: один — із південного Поділля (збори В. Бессера), два — із околиць Одеси (екскатії А. Ланга, О. Шовіца: «N 33, Herb. ruth. Cent. 1»), і ще один — без вказівки місця збору. К. Шпренгель у протозі місце опису виду подає так: «*Podolia (C. lineatus Besser)*». На етикетці гербарного аркуша, де є чотири зразки, один з яких вибрано за типовий, спочатку всі вони були визначені як «*Convolvulus lineatus*» за «*Enumeratio Plantarum Volhynia ...*», (1822), а пізніше (1828) — перевізначені як «*Convolvulus besseri* Spr.».

2. *C. bracteosus* Juz. 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 12: 217; Вісюліна, 1957, Фл. УРСР, 8: 298, pro syn. *C. tauricus* (Bornm.) Juz. var. *bracteosus* (Juz.) Wissjul.; Смольянінова, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 99, pro syn. *C. tauricus* (Bornm.) Juz. subsp. *bracteosus* (Juz.) Smoljan.

Тип: «... над Ялтою (Штангевская тропа), 26.05.1901, fl. В. Траншель» (LE, лектотип).

3. *C. hirsutus* M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 422; Вісюліна, 1957, Фл. УРСР, 8: 302; Смольянінова, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 95, pro syn. *C. betonicifolius* Mill.

Тип: «... in collibus aridis, mari nigro vicinis, prope Tauriae meridionalis pagum Gursuph. D. Steven» (LE).

4. *C. holosericeus* M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 147; Вісюліна, 1957, Фл. УРСР, 8: 298; Смольянінова, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 99.

Тип: «... in Tauriae montibus calcareus» (LE).

5. *C. sericocephalus* Juz. 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 12: 219; Вісюліна, 1957, Фл. УРСР, 8: 298, pro syn. *C. tauricus* (Bornm.) Juz. var. *sericocephalus* (Juz.) Wissjul.; Смольянінова, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 99.

Тип: «... западная сторона Феодосийского шоссе на 16 версте, целинный участок Общества распространения просвещения среди евреев, 27.05.1913, fl. А. Яната, А. Дойч» (LE, лектотип).

6. *C. tauricus* (Bornm.) Juz. 1950, Ботан. мат-ль (Ленінград), 12: 214; Вісоколіна, 1957, Фл. УРСР, 8: 296; Смольянінова, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 97, pro syn. *C. calvertii* Boiss. subsp. *tauricum* (Bornm.) Smoljan. — *C. calvertii* Boiss. var. *tauricus* Bornm. 1906, Beih. Bot. Centralbl. 20, 2 Abt.: 181.

Тип: «*Tauria in collibus cretaceis ad Burultscha prope Karassubazar, 06.05.1903, fl. defl. a Callier*» (LE, лектотип).

CUSCUTACEAE DUMORT.

Cuscuta L.

1. *C. rogovitziana* Trautv. 1855, Mem. Biol. 2, 16/28 Mart.: 285; Вісоколіна, 1957, Фл. УРСР, 8: 316, pro syn. *C. australis* R. Br.

Тип: не з'ясований (LE?).

Примітка. У колекції П. Роговича (KW) зберігається лише один екземпляр: «*Cuscuta Rogovitchiana* Trautv. Пол. губ.коло Константинограда на солончаках 11 augusta 1854, A. Рогович». Можливо, що цей зразок є автентичним.

BORAGINACEAE JUSS.

Anchusa L.

1. *A. canescens* Steven, 1851, Bull. Soc. Nat. Mosc., 24: 581; Доброчаєва, 1957, Фл. УРСР, 8: 407, pro syn. *A. leptophylla* Roem. et Schult.

Тип: «... specimenina taurica et podolica ...» (H.).

2. *A. ochroleuca* M. Bieb. subsp. *popovii* Guşul. 1960, Fl. Republ. Popul. Române, 7: 644. — *A. popovii* (Guşul.) Dobrocz. 1977, Нов. системат. высш. и низш. раст., 1976: 120, descr. superfl.; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 147.

Тип: «... in URSS meridionali, in cursu inferiore fluvii Don et Donetz, verosimiliter et in cursu iferiore Volgae.» (CL?).

Примітка. Описаний М. Гушуляком підвид Д. Доброчаєва перевела у ранг виду, зробивши при цьому повторний його опис. За тип виду (лектотип) Д. Доброчаєва вибрала виданий М. Поповим екземпляр, зібраний в locus classicus: «Українська СРР, Ворошиловградська обл. Близ г. Старобельська. На силичих пісках. Собр. И. Шираевский. 16.07.1904» (Герб. фл. СССР, N 3573). Однак, за Правилами ботанічної номенклатури, наведений Д. Доброчаєвою діагноз виду є «descriptio superficuum», а вибраний нею лектотип недійсний; тому тип (лектотип) подається за протологом, гербарний зразок якого, очевидно, знаходиться в Клужі (CL).

3. *A. procera* Besser, 1822, Епіт. Pl. Volhyn.: 8; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 148.

Тип: «Podolia» (KW, лектотип).

4. *A. pseudoochroleuca* Desj.-Shost. 1941, Уч. зап. Харків. держ. ун-ту, 22, 4: 190; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 147.

Тип: «AMCCP. Колкотова балка, в 4 км. к сев.-зап. от с. Білий хутор, склон с зап. экспозицієй. 28.07.1930. Leg. П. Опперман» (KW, голотип).

5. *A. stylosa* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 123; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 149.

Тип: «... in Tauriae collibus lapidosis ad rivum Karasu minorem ...» (LE).

Примітка. В «Каталоге типових образцов сосудистых растений гербария Московского университета (MW)» зазначено, що там зберігається ізолектотип (Herb. Trin. N 6141).

Echinosperrum Sw.

1. *E. semicinctum* Steven, 1851, Bull. Soc. Nat. Mosc. 24: 605; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 428, pro syn. *Lappula semicincta* (Steven) Popov, in adnot. ad *L. heterocantha* (Ledebe.) Gurke; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 167, pro syn. *L. semicincta* (Steven) Popov ex Dobrocz., sine auct. comb.

Тип: «... circa Zaleszczki ad fines Bukovinae» (H.).

Echium L.

1. *E. biebersteinii* Lacaita, 1919, Journ. Linn. Soc. London (Bot.), 44: 408; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 138. — *E. italicum* L. var. *biebersteinii* (Lacaita) Klotz, 1960, Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, 9, 3: 369.

Тип: «*In Tauriae, Caucasi orientalis et Iberiae campis*» (місцевознаходження типу не з'ясоване, можливо він зберігається в гербаріях Великої Британії (*LINN*) або Іспанії).

2. *E. popovii* Döbrocz. 1977, Нов. системат. высш. и низш. раст., 1976: 117; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 137.

Тип: «Украинская ССР, Крымская обл., Ялтинский горсовет. В горах над с. Никитой, 29.05.1916, С. Станков» (*LE*, голотип).

Heliotropium L.

1. *H. incanescens* Andr. 1862, Иссчил. раст. Подольск. губ., 2: 116; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 145, про syn. *H. europeum* L.; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 122, про syn. *H. dolosum* De Not.

Тип: «*Heliotropium incanescens* nob. Jaorlik Pod. austr.» (*KW*, лектотип).

Примітка. В колекції В. Бессера (*KW*) цитованих у протолозі «*Tyraspoli et Manjak nec non ad Ingulec circa Cherson*» зразків немає. Всі наявні гербарні екземпляри зібрані з Південного Поділля.

2. *H. intermedium* Andr. 1851, in Steven, Bull. Soc. Nat. Moscou, 24: 563; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 120; Доброчаева, 1955, Фл. УРСР, 8: 340, про syn. *H. suaveolens* M. Bieb.

Тип: «*Ostia Hypanis circa Kistanowka, 27—29, Andr.*» (*KW*, лектотип).

3. *H. littorale* Steven, 1851, Bull., Soc., Nat. Moscou, 24: 565; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 122, про syn. *L. dolosum* De Not.

Тип: «*In arena littorali et in graveosis Tauriae circa Sudak et Tarchankut, etiam in insula Taman*» (*H*).

4. *H. stevenianum* Andr., 1862, Иссчил. раст. Подольск. губ., 2: 116; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 120; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 145, про syn. *H. europeum* L.

Тип: «*Nicopol*» (*KW*, лектотип).

5. *H. subcanescens* Andr. ex Steven, 1851, Bull. Soc. Nat. Moscou, 24: 564; Доброчаева, 1955, Фл. УРСР, 8: 335, про syn. *H. stevenianum* Andr.; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 145, про syn. *H. europeum* L.

Тип: «*Hoc per totam Tauriam campestrem in agris recenter aratis autumno vulgarissimum, etiam in arena mobili circa ostia Borysthenis; idem Odessa legi et inde a Bessero sub. monine quod servavi missum; nec circa Taman, Stavropolo alibique in gubernio Stavropolense vidi; ex Armenia rossica misit Szovitz ...*» (*H*).

Lappula L.

1. *L. heterocarpa* Klokov et Artemcz. 1952, Ботан. журн. АН УРСР, 9, 3: 81; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 167, про syn. *L. semicincta* (Steven) Popov ex Dobrocz., sine auct. comb.

Тип: «УРСР, Кам'янець-Подільська обл. УРСР, Кам'янець-Подільський р-н, с. Цибулівка. Лівий берег р. Смотрича, 13.06.1949, зібрала Г. Кузнецова» (*KW*, голотип).

Lycopsis L.

1. *L. orientalis* L., 1753, Sp. Pl.: 139; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 151.

Тип: «*in Oriente*» (окр. Сімферополя і Судака) (*LINN*).

2. *L. taurica* Ledeb., 1820, Beitr. Naturk. (Dorpat), 1: 64; Доброчаева, 1957, Фл. УРСР, 8: 433, про syn. *Nonea taurica* (Ledeb.) Ledeb.; вона ж, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 153, про syn. *N. taurica* (Ledeb.) Ledeb.

Тип: «*prope Karassubasar*» (*LE*).

Lithospermum L.

1. *L. czernjaevii* Klokov et Desj.-Shost. 1936, Тр. Ін-ту ботан. Харк. ун-ту, 1: 75; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 125, про syn. *Buglossoides czernjaevii* (Klokov) Czerer.

Тип: «Харьков. Мерефа. Большой бор. Местами обильно по опушке и прореженным местам, 15.05.1927, М. Klokov» (*CWU*, голотип).

2. *L. strigosum* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 121; Доброчаева, 1957, Фл. УРСР, 8: 346, про syn. *L. apulum* (L.) Vahl.

Тип: «... in Tauria maxime meridionali circa Kuru-Ufen ...» (*LE*).

Myosotis L.

1. *M. barbata* M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 121; Доброчаєва, 1957, Фл. УРСР, 8: 491, pro syn. *Lappula barbata* (M. Bieb.) Guerke; вона ж, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 169, pro syn. *L. barbata* (M. Bieb.) Guerke.

Тип: «... in Tauriae montibus calcareis circa Karassubasar et ad Caucasum, ... circa oppidum Mosdok...» (LE).

Примітка. В «Каталоге типових образцов сосудистых растений гербария Московского университета (MW)» зазначено, что там зберігається ізолектотип (Herb. Trin. N 6159).

2. *M. litoralis* Steven ex M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 118; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 160.

Тип: «... in littore arenoso ponti euxini per Tauriam maxime meridionalem» (LE).

Примітка. В «Каталоге типових образцов сосудистых растений гербария Московского университета (MW)» зазначено, что там зберігається ізолектотип (Herb. Trin. N 6167).

3. *Myosotis lithuanica* (Schmalh.) Besser ex Dobrocz. 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 160; Besser, in herb. — *M. palustris* Lam. var. *lithuanica* Schmalh. 1897, Фл. Ср. и Юж. Рос., 2: 234.

Тип: «circa Poczajow» (KW, лектотип).

Примітка. Вид виділений В. Бессером, але без опису. І. Шмальгаузен (I. c.) описав його як різновидність: *M. palustris* Lam. var. *lithuanica* Schmalh., базуючись на зразках В. Бессера з Пochaївською, які він цитує першими, а також на власних зборах з окол. Києва та зборах Й. Пачоського з Жлобина Могильовської губ.

4. *M. ludomilae* Zaverucha, 1962, Укр. ботан. журн., 19, 5: 50; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 161, pro syn. *M. popovii* Dobrocz.

Тип: «Горнопільська обл., Кременецький р-н, околиці с. Жлоби, гора Страхова, на сарматських пісках, змішаних з уламками вапняку, 20.05.1960, Б.В. Заверуха» (KW, голотип).

5. *M. nemorosa* Besser, 1809, Prim. Fl. Galic.: 142; Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 52; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 160.

Тип: «Volhynia» (KW, лектотип).

6. *M. pinetcola* Klokov & Desj.-Shost. 1941, Уч. зап. Ін-ту ботан. ХДУ, 22: 147; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 161, pro syn. *M. uscrainica* Czern.

Тип: «Харьковская обл., Мерефянское л-во. Сосновый бор. 15.06.1966. М.И. Котов, О.П. Мринский» (KW, неотип).

Примітка. Типовий екземпляр, який цитують автори виду «УССР. Окр. г. Мерефи Харківської обл., в «Большом бору» на пониженнем сыроватом месте. 24.06.1940 (fr. fl.), М.В. Клоков, В.В. Азеев», що зберігався в Харкові, загублено, тому обрано неотип з locus classicus.

7. *M. popovii* Dobrocz., 1957, Фл. УРСР, 8: 527, рис. 94; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 161.

Тип: «Ворошиловградская обл., Меловский р-н, заповедник «Стрелецкая степь». Плато. 13.05.1955, Сарычевка» (KW, голотип).

8. *M. uscrainica* Czern. 1845, Bull. Soc. Nat. Moscou, 18, 3: 133, «ucrainica»; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 161.

Тип: «За Валкінським лесом. Circa Charcoviam, Junior a. 08.05.1851, ... fructifer 28.05.1851, legit Auctor» [Ex herbario V. Czernjaewi] (KW, лектотип).

Nonea L.

1. *N. rossica* Steven, 1851, Bull. Soc. Nat. Moscou, 24, 1: 572; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 152.

Тип: «e gub. Charkov, Kursk, Catherinoslav et Cherson» (H).

2. *N. pulchella* Pacz. 1889, Зап. Киев. о-ва естествоиспытат., 10, 2: 429; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 336; Доброчаєва, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 153, pro syn. *N. pallens* Petrovic.

Тип: «In lapidosis calcareis et in locis subarenosis ad Borysthenem inferiorem prope Kaczkarowka ...» (Гербарій Херсонського краєзнавчого музею, KHER).

Onosma L.

1. *O. bifrons* Steven ex DC. 1846, Prodr., 10: 65; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 194, про
syn. *O. polyphylla* Ledeb.

Тип: «*Tauriaeae* (cl. Godet)» (G?).

2. *O. borysthenica* Klokov, 1953, Ботан. мат-лы (Ленинград), 15: 243
(«*borysthenicum*»); Доброхачева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 130. — *O. arenaria* auct.
fl. ucr., non Waldst. & Kit.

Тип: «Миколаївська (Херсонська) об-сть, Цюрупинський р-н, с. Пролетарське. На
пісках Нижнього Дніпра, 06.08.1937, Липа О.Л., Барбач А.І.» (KW, голотип).

3. *O. graniticola* Klokov, 1953, Ботан. мат-лы (Ленинград), 15: 246; Доброхачева,
1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 130.

Тип: «Укр. РСР, Одеська область, Богданівський радгосп. На степових схилах,
23.07.1950, Ф. Гринь» (KW, голотип).

4. *O. polychroma* Klokov ex Poroj, 1951, Ботан. мат-лы (Ленинград), 14: 301, in clavi
(«*polychromum*»); Клоков, 1950, Визн. росл. УРСР: 364, descr. іст., він же, 1953, Ботан.
мат-лы (Ленинград), 15: 234, descr. fus. iter.; Доброхачева, 1981, Фл. европ. ч.
СССР, 5: 131.

Тип: «Небольшой под в конце заповедного участка. По окраине пода. Аскания-Но-
ва. 20.05.1924, А. Окснер» (KW, голотип).

5. *O. polyphylla* Ledeb. 1820, Beitr. Naturk. (Dorpat), 1: 72 («*polyphyllo*»); Доброхач-
ева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 129.

Тип: «in *Tauriae meridionalis rupestribus, praesertim calcareis*» (LE).

6. *O. pseudotinctoria* Klokov, 1953, Ботан. мат-лы (Ленинград), 15: 240
(«*pseudotinctoriatum*»); Доброхачева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 131.

Тип: «Полтавской губернии (Киевская обл.) около Белой Церкви на степях, 1852.
Ex herbario Netubsky» (KW, голотип).

7. *O. rigida* Ledeb. 1820, Beitr. Naturk. (Dorpat), 1: 67 («*rigidum*»); Ledebour, 1821,
in Lehmann, Icon. Nov. Scirp., 1: 11; idem, 1847, Fl. Ross., 3: 124; Попова, 1979, Нов.
системат. высш. раст., 15: 204; Доброхачева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 131.

Тип: «*Tauria inter Gursuf (Jursuf) et Nikitam*» (LE, лектотип).

8. *O. subtinctoria* Klokov, 1953, Ботан. мат-лы (Ленинград), 15: 237
(«*subtinctoriatum*»); Доброхачева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 131.

Тип: «Артемівськ. Гришинський р. Криворізька с/р. с-г агр. «Червона зірка»,
циліна. 19.06.1928, А. Олексій» (KW, голотип, ізотип).

9. *O. tanaitica* Klokov, 1949, Ботан. журн. АН УРСР, 6, 3: 72 («*tanaiticum*»); Добро-
хачева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 129.

Тип: «Донецька обл., Слов'янський р-н, Святогорськ. На крейдяний горі.
01.08.1934, A.L. Lypa» (KW, голотип, ізотип).

10. *O. taurica* Pall. ex Willd. 1799, Naturf. Freunde Berlin Neue Schr., 2: 212
(«*tauricum*»); Попова, 1979, Нов. системат. высш. раст., 15: 205; Доброхачева, 1981,
Фл. европ. ч. СССР, 5: 133.

Тип: «Herb. Willd. N 3367, Pallas» (B, лектотип).

11. *O. tinctoria* M. Bibb. 1800, Beschr. Land Terek: 136 («*tinctorium*»); Доброхачева,
1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 130.

Тип: «In *Tauriae pascuis circa Kertsch*» (LE, лектотип).

Примітка. У літературі, зокрема у «Флорі СССР» (1953, 19, с. 218), наводиться та-
ж *Onosma calycina* Steven («*calycinum*»), назва якого, як виявилось, є омонімом
раніше описаного Ю.Л.Е. Ав-Лаллемантом (Ave-Lall. = Lallem.) таксона. Тому,
пізніше М. Клоковим і Д. Доброхачевою його було описано як *O. macrochaeta* Klokov et
Dobrocz.:

O. macrochaeta Klokov et Dobrocz. 1957, Фл. УРСР, 8: 527 («*macrochaetum*»); Добро-
хачева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 130; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. Рос. и соп-
ред. госуд.: 238, pro syn. *O. visianii* Clementi. — *O. calycinum* auct., non Steven: Попов,
1953, Фл. СССР, 19: 218.

Тип: «Молдавская ССР, окр. г. Дубоссары, известняковые склоны по р. Днестру, 22.06.1952, М. Котов, Г. Кузнецова» (KW, голотип).

Pulmonaria L.

1. *P. filarszkyana* Jav. 1916, Bot. Kozllem., 15: 52; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 156.

Тип: «In monte Nagy Pietrosz supra vallem Iza, ... supra vallem Bukuiezku» (BP).

Solenanthus Lebed.

1. *S. biebersteinii* DC. 1846, Prodr., 10: 165; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 177.

Тип: «Pages Kisilkoba et Uluusen (cl. Steven)» (LE, лектотип).

Sympyton L.

1. *S. besseri* Zaverucha, 1962, Укр. ботан. журн., 19, 5: 55; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 141, pro syn. *S. microcalyx* Opiz.

Тип: «Тернопільська обл., Вел.-Дедеркальський р-н, околиці села Цеценівка, дубово-грабовий ліс, 18.05.1960, Б.В. Заверуха» (KW, голотип; LE, ізотип).

2. *S. microcalyx* Opiz, 1839, in Bericht. Oekon-techn. Fl. Bohm., 2, 2: 172; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 141.

Тип: «In Laubwaldern an den Ufern des Dnister bei Czernelica» (PR?).

3. *S. popovi* Dobrocz. 1968, Укр. ботан. журн., 25, 6: 59; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 141.

Тип: «В грабовому лісі біля с. Садики, Теребовлянського р-ну, Тернопільської обл. 02.07.1940, Ф. Гринь» (KW, голотип).

4. *S. tauricum* Willd. 1799, Neue Schrift. Ges. Naturf. Berlin, 2: 120; Доброчаева, 1981, Фл. европ. ч. СССР, 5: 141.

Тип: «... in Taurien» (B.).

Автори широ відчні д-ру біол. наук. С. Зиман (Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ), д-ру біол. наук А. Кузьмичову (Ін-т біології внутрішніх вод ім. І.Д. Папанія РАН, с. Борок), канд. біол. наук О. Кагалу (Ін-т екології Карпат НАН України, м. Львів), канд. біол. наук В. Виноградов (Ботанічний ін-т ім. В.Л. Комарова РАН, м. С.-Петербург) за допомогу в отриманні протологів деяких видів.

Л.И. Крицкая, Н.М. Федорончук, М.В. Шевера

ТИПИФІКАЦІЯ ВІДОВ СОСУДИСТІХ РАСТЕНИЙ, ОПИСАНИХ С УКРАЇНОЮ:

СЕМЕЙСТВА ONAGRACEAE JUSS., TRAPACEAE DUMORT.,

ASCLEPIADACEAE LINDL., CONVOLVULACEAE JUSS., CUSCUTACEAE DUMORT.,

BORAGINACEAE JUSS.

Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного НАН України, г. Київ

Приведен список видов семейств Onagraceae Juss., Trapaceae Dumort., Asclepiadaceae Lindl., Convolvulaceae Juss., Cuscutaceae Dumort., Boraginaceae Juss., описаних з території України. Для кожного віда указана основна синоніміка, номенклатурний тип (цитування протолога або голотипа, лектотипа и/або ізотипа, неотипа) і місце його зберігання.

Л.І. Кріцька, М.М. Федорончук, М.В. Шевера

TYPIFICATION OF SPECIES OF VASCULAR PLANTS DESCRIBED

FROM UKRAINE: FAMILIES ONAGRACEAE JUSS., TRAPACEAE DUMORT.,

ASCLEPIADACEAE LINDL., CONVOLVULACEAE JUSS., CUSCUTACEAE DUMORT.,

BORAGINACEAE JUSS.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The list of species of the families Onagraceae Juss., Trapaceae Dumort., Asclepiadaceae Lindl., Convolvulaceae Juss., Cuscutaceae Dumort., Boraginaceae Juss. described from Ukraine is provided. The following data are presented: basionym; original nomenclatural citation; protolog citation; holotype, lectotype and/or isotype, neotype; herbarium (herbaria) at which the specimen(s) is/are deposited.